

Impfempfehlungen für Krebspatienten

ALLE TOTIMPfstoffe KÖNNEN **WÄHREND** DER CHEMOTHERAPIE DURCHFÜHRT WERDEN. DA DIE WIRKSAMKEIT DER IMPFUNGEN REDUZIERT SEIN KANN, SIND TITERKONTROLLEN SINNVOLL.

Impfungen	während Chemo	Bemerkungen	≥ 3 Mo. nach Chemo	Bemerkungen
DiTetPertPolio	möglich zwischen Zyklen	Titerkontrollen	empfohlen	Titerkontrollen
Influenza (IIV)	empfohlen in Saison	am Beginn der Chemo	routinemäßig	2xige Applikation (siehe Impfplan)
Pneumo (PCV13/PPV23)	möglich	bevorzugt 2 Wo vor Chemo	empfohlen	kein Titer möglich
HIB - Haemophilus influenza Typ B (HIB)	möglich	bes. Kinder mit hämatolog. Malignomen, 2 Wo vor Therapiebeginn	empfohlen	Kinder, Lungenkrebs kein Titer möglich
Meningokokken (Men ACWY, Men B)	möglich		empfohlen	lt. Impfplan f. Risikopatienten
HPV	keine Daten		empfohlen	lt. impfplan
FSME	keine Daten	vor Chemo	empfohlen	Titerkontrolle
Herpes Zoster (inaktiviert)	keine Daten	vor Chemo	empfohlen	eventuell Titer

LEBENDIMPfstoffe DÜRFEN **WÄHREND** EINER CHEMOTHERAPIE **NICHT** GEGEBEN WERDEN. EIN EMPFOHLENER ZEITABSTAND ZWISCHEN ABSCHLUSS DER BEHANDLUNG UND LEBENDIMPFUNGEN IST NÖTIG.

Lebendimpfung	≥ 6 Monate nach Chemo	≥ 12 Mo. nach Anti-B Zell Th.	Bemerkungen
(Rotavirus)	n.a.	n.a.	nur bei Kindern zw. 2. und 8. Lebensmonat
LAIV (Influenza)	nur 2 - 18 Jahren	nur 2 - 18 Jahren	Alternative: IIV - inaktiviert
MMR	empfohlen	empfohlen	vorher Titerkontrolle
Varizellen	empfohlen	empfohlen	vorher Titerkontrolle *)

*) Alternative zum Lebendimpfstoff: inaktivierter Herpes Zosterimpfstoff auch bei Varizellen seronegativen Erwachsenen
https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/5/4/7/CH4062/CMS1546865142466/190211_impfplan_oesterreich_2019_web.pdf